

### ඖෂධ අසාත්මිකතා සහ අභිතකර පුතිචාර

### අහිතකර පතිචාරයක් යනු කුමක්ද?

අභිතකර පතිචාරයක් යනු බෙහෙතක් පාවිච්චි කිරීම හා සම්බන්ධව ඇතිවිය හැකි හානිකර පතිඵලයයි. අසාත්මික සහ අසාත්මික නොවන පතිචාර, බෙහෙත් අතර පතිචාර සහ අතුරු ඵල මීට අයත් වේ.

### බෙහෙත් අසාත්මිකතාවයක් යනු කුමක්ද ?

බෙහෙත් අසාත්මිකතාවයක් යනු පුතිශක්ති පද්ධතිය හා සම්බන්ධව ඇතිවන හානිකර පුතිඵලයයි .

අසාත්මක පතිචාර මෘදු (පලු මතුවීම) වී ඔබට නැවත බෙහෙත පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන් විය හැකිය. නැතහොත් අසාත්මක පතිචාර උගු වී (දරුනු අසාත්මක පතිකියාව) ඔබට නැවත බෙහෙත පාවිච්චි කිරීමට නොහැකි විය හැකිය.

බෙහෙත් අසාත්මිකතා ක්ෂණිකව (බෙහෙත පාවිච්චි කර පැයක් ඇතුලත ඇතිවන) හෝ පුමාද වී (බෙහෙත පාවිච්චිය පටන් ගෙන දින හෝ සති ගණනකට පසු ඇතිවන) ඇතිවිය හැක.

අසාත්මික පතිචාරයකට මේවා ඇතුලත් විය හැක:

- සමේ පල මතුවීම, කුෂ්ට (hives) සහ/හෝ කැසීම
- ශබ්ද නගමන් හුස්ම ගැනීම හෝ වෙනත් ශ්වසන ගැටලු
- ඉදිමුම
- දරුනු අසාත්මික පතිකියාව

ළමා කාලයේ හටගත් සමහර අසාත්මිකතා වැඩිහිටි වයසේදී තවදුරටත් හට නොගැනීමට ඉඩ තිබේ. ඔබට ළමා වියේ තිබුන අසාත්මිකතා තවමත් වැදගත්ද යන්න සොයා ගැනීමට ඔබට අසාත්මිකතා පරීකෳණයක් කර ගැනීමට පුළුවන.

ඹව වෙහෙතකට අසාත්මක පුතිකියා දැක්වුව හොත් ඔව බෙහෙත ගැනීම නතර කර ඔබේ වෛදූපවරයා ඇමතිය යුතුය. පුතිකියාව දරුනු නම් 000 අමතන්න.

### අතුරු එල

ඔක්කාරය, පාචනය සහ හිසරදය ඇතිවිය හැකි අතුරු එල අතරට ඇතුල් වන අතර සාමානපයෙන් මේවා සුළු සහ තාවකාලික අතුරු එලයන්ය. මේවා අසාත්මික පුතිචාර නොවන අතර ඔබට නැවත බෙහෙත පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන.

### ඔබේ බෙහෙත් අසාත්මිකතා සහ අභිතකර පුතිචාර සදහා ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ඔබේ වෛදය වාර්තාවේ අපට සටහන් කර ගැනීමට හැකි වනු පිණිස, ඔබට මින් පෙර යම් බෙහෙත් වලට අහිතකර පතිචාර හටගෙන තිබේදැයි ඔබ රෝහල් ගත වු විට ඔබෙන් අසනු ඇත. ඔබ මීට පෙර අහිතකර පතිචාර දක්වා ඇති බෙහෙතක් ඔබට අප විසින් නෝදීමට සහතික කර ගැනීම අපට අවශපය.

පහත දේවල් අපට කියන්න:

- පතිචාරයක් හට ගත්තේ කුමන බෙහෙතටද
- එය හටගත්තේ කවදාද
- පුතිචාරය කුමක්ද

රෝහලේදී ඔබට දෙන ලද ඕනෑම වෙහෙතක් ගැන යම් උශ්න ඔබට ඇත් නම් සාත්තු සේවක, වෛදපවරයා හෝ ඖෂධවේදියාගෙන් නොපැකිල එ ගැන අසන්න.

ඔබට පතිචාරයක් හටගන ඇත්නම්, එ ගැන ඔබේ සත්කාරකයන්, වෛදපවරුන් සහ ඖෂධවේදීන් සමග බෙදා හදා ගැනීමට හැකි වනු පිනිස, එම පතිචාර පිළිබඳ ලිබ්ත තොරතුරු ඔබට ලබාදෙන බව සහතික කර ගන්න. ඔබට බෙහෙත් වලට හටගන ඇති පතිචාර ගැන ඔබේ පුදේශයේ වෛදපවරයා සහ ඖෂධවේදීයා සමග සෑම විටම කියන්න.

ඔබට යම් බෙහෙතකට දරුනු පුතිකුියාවක් හටගන තිබේ නම් ඒ ගැන ඔබ ලිබිත තොරතුරු ලඟ තබා ගන්නා ලෙස නිර්දේශ කරනු ලැබේ. මෙමගින් ඔබට වෛදුප පුතිකාර අවශුප වූවිට ඒ ගැන ගැන අනිකුත් අයට අනතුරු හැගවීමට හැකි වේ . ඔබේ පර්ස් හෝ චොලට්ටුවේ අනතුරු හැගවීම් කාඩි පතක් තබා ගැනීම හෝ MedicAlert® වළල්ලක් හෝ මාලයක් පැළඳීම මීට උදාහරන වේ.



# Medication allergies and adverse reactions

### What is an adverse reaction?

An adverse reaction is the possible harmful effect related to taking a medicine. This includes allergic and non-allergic reactions, interactions between medicines and side effects.

### What is a medicine allergy?

A medicine allergy is when an adverse reaction occurs involving the immune system.

Allergic reactions may be mild (rash) and you may be able to have the medicines again or reactions may be severe (anaphylaxis) and you should not have the medicine again.

Medicine allergies may be immediate (occurring within an hour of having the medication) or delayed, occurring days or weeks after the medication has been started.

An allergic reaction may include:

- skin rash, hives and/or itching
- wheezing or other breathing problems
- swelling
- anaphylaxis

Some allergies experienced in childhood may no longer affect you as an adult. You may want to have allergy testing to find out if your childhood reactions are still important.

If you are having an allergic reaction to a medicine, you should always stop the medicine and contact your doctor. If the reaction is severe call 000.

### Side effects

Side effects to medicines may include nausea, diarrhoea and headache and are usually minor and temporary. These are not allergic reactions and you may be able to have these medications again.

## What do you need to do about your medication allergies and adverse reactions?

While in hospital you will be asked if you have had any adverse reactions to medicines so we can document the reaction in your medical record. We want to make sure we do not give you a medicine you have had a reaction to in the past. Please let us know:

- which medicines caused a reaction
- when it happened and
- what the reaction was

Feel free to ask your nurse, doctor or pharmacist if you have questions about any medicines you are given in hospital.

If you have a reaction, make sure you are given information in writing about the reaction to share with your carers, doctors and pharmacists. Always tell your local doctor and pharmacist about any reactions you have had to medicines.

If you have had a severe reaction to a medicine, it is recommended that you carry written information with you to alert others in case you need medical attention. Examples of this include an alert card in your wallet or purse or wearing a MedicAlert® bracelet or pendant.